
Lessons Learned from Breastfeeding Promotion in



Armenia

Kim Hekimian, PhD
Institute of Human Nutrition,
Columbia – AUA Symposium
May 26, 2014



A quick history of the problems...

- Gained independence in 1991
- Blockaded by Turkey and Azerbaijan
- War, Earthquake
- No heat, no electricity





A Story of Humanitarian Assistance Gone Wrong...

- Economic collapse, infrastructure changes, poor water quality
- Increases in Infant Mortality, Diarrhea, ARI
- Infant formula as humanitarian aid post-1988
 - o 900 metric tons annually
 - Growing dependency; impending cessation
 - MOH faces dilemma



What were mothers feeding infants?

The importance of research!

- Very little data
- Mostly anecdotal
- "Women can't breastfeed because of stress"
- USAID funds national study

First Phase: Qualitative Research



- Focus groups
 - With Mothers
 - With Mothers-In-Law
 - With Pediatricians, Nurses, Ob-Gyns
- In-depth interviews
- Observations at Maternity Hospitals
- Develop a picture of the problem, generate hypotheses to be tested quantitatively

Use of a Conceptual Model for Behavior Change


Conceptual Framework of Factors Influencing Breastfeeding Behavior in Armenia (Based on the Precede-Proceed Framework) Predisposing Factors Maternal Knowledge Socio-Demographic Promotional Activities Variables: Physician Training IEC Campaign Behavioral Reinforcing Factors Outcomes Healthcare Provider Infant Feeding Support in Hospitals Practices: Infant Health e ΔRI e Diambea. Infections. **Enabling Factors** Postpartum Care Practices Regarding Breastfeeding. Environmental Factors Policy Changes Formula Availability MOH Directive Water Quality Donor Agency - Formula Medical School Curriculum Distribution

Infant Health

- ARI
- Diarrhea
- Infections

Infant Health Outcomes

- ARI
- Diarrhea
- Infant mortality



Feeding Behaviors












Infant Feeding Practices, Baseline



[&]quot;Improving Infant Feeding Through

 Multiple Interventions"," Kim Hekimian, PhD





Free Distribution of Formula




















Post Partum Care Practices, baseline









What did the Pediatricians say?





 Multiple Interventions"," Kim Hekimian, PhD

Armenian Pediatricians' Knowledge Regarding

Breastfeeding: Percent Answering Correctly

Statements Read	1993 (n = 70)	1997 (n = 92)
A newborn baby must be given water to quench thirst, even if BF [False]	7.2%	84.6%
"Test Weighing" is the best way to determine if breast milk is insufficient and should be supplemented with formula [False]	23.2%	75.0%
Babies should be breastfed on a schedule [False]	31.4%	93.4%
Breast milk with a watery texture should be supplemented with formula [False]	57.1%	82.2%






What did the moms say?


"uuupup" (insufficient)


"There's no milk)


"tpthuu lug tp lhunu"

(The child was crying)









Social Marketing Campaign

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ԱՇԽԱՐՀԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՆՈՒՆԴԸ՝



บน3าน4นบ 4นคะ

Բոլու մանուկները
սիւում են այն։
Եժան է։ Անաւաs։
Միշ թաւմ։
Կաւիք չունի sաքացվելու
կամ սառեցվելու։
Պաsւասs է մաsուցման։

«Նախքան փոքրիկիս Ծնվելը մշահոգ էի, որ կաթս չի բավարարի նրան, կամ կլինի նոսր ու անորակ։ Բայց, երք հայշնաբերեցի կրծքով սնուցման նոր նախաղայմանները, հաղթահարեցի մշավախություններս։ Դեշեւելով մի քանի պարզ ցուցումների դուք էլ կարող եք հաջողությամբ կրծքով կերակրել ձեր մանկիկին»։

Six Main Messages

Յեsեւե՛ք ցուցումներին՝ կհասնեք հաջողության




Սկսեք կrófով կեrակrել ծննդաբեrությունից անմիջապես հեsո՝ կես ժամվա ընթացքում, հենց ծնաrանում։ Ոrfան cnւs, այնքան լավ։



Ո՛չ կաթ, ո՛չ ջուr, ո՛չ թեյ, ո՛չ հյութ։ Ոչի՛նչ հաrկավոr չէ, բացի մայrական կաթից առաջին 4-ից 6 ամսում։



Յիվանդանոցում եrեխային միշs ձեr սենյակում պահեք։ Այսպիսով կաrող եf հաճախ կեrակrել թե՛ ցեrեկը եւ թե՛ գիշեrը։



Ռեժիմով մի՛ կեrակrեք։ Կեrակrեք ցmաhանջ՝ ե՛ւ ցեrեկը, ե՛ւ գիշեrը։ Յաճա՛խ կեrակrեք։ Յաճախակի կեrակrումնեrը կնmասsեն կաթնաrsադrությանը։


Կեrակrեք միա՛յն ու միայն կrծfով 4-ից 6 ամիս։ Մայrական կաթ։ Սա միակ սննուդն է, ոrն անhrաժեշs է եrեխային կյանքի առաջին 4-ից 6 ամսում։ Այն փոքրիկին կոյաշողանի վարակիչներից։


Մի՛ մѕահոգվեք ձեr կաթի քանակի ու ուակի համաւ։ Մի՛ մsաhnգվեհ, nr աղհաsիկ սնունդը կվնասի ձեr կաթնաrsադrությանը։ Նույնիսկ հիչ սնվելով դուհ եrեխային կաղահովեհ բավաrաr սննդաrաr կաթով։




Կrծfով կեrակrելու նոr ցուցումների գrfույկը ձեռք բեrելու համաr դիմեք ձեr crջանի mոլիկլինիկա

Health Education Material






Changes in Post-Partum Practices, Armenia 1993 - 2010




Empty Nursery Post-Intervention



Changes in Infant Feeding Practices in Armenia: 1993, 1997, 2010



Duration of breastfeeding



K. Saribekyan, Armenia MoH, based on DHS 2010

Leadership













Lessons Learned

